

Admissibilité aux vaccins RRO, anti-varicelle et RROV, et calendriers

Les tableaux 1 et 2 ont été établis à titre d'information uniquement afin de faciliter la tâche des professionnels de la santé au chapitre des critères d'admissibilité et du calendrier de vaccination systématique, de rechange et de rappel pour les vaccins RRO, anti-varicelle et RROV. Consultez les *Calendriers de vaccination financée par le secteur public* pour plus de détails sur l'âge d'administration.

Tableau 1 : VACCINATION SYSTÉMATIQUE - Vaccins RRO, anti-varicelle et RROV

Groupe d'âge admissible	Doses et calendrier recommandés		
	RRO	Var	RROV
À partir de l'âge de 12 mois	1 dose (12 mois)	1 dose (15 mois)	1 dose (4 - 6 ans)

Tableau 2 : VACCIN DE RAPPEL contre la varicelle à deux doses

Groupe d'âge admissible	Doses et calendrier recommandés		
	RRO	Var	RROV
Enfants nés le 1 ^{er} janvier 2000 ou après âgés d'au moins 12 mois et ayant déjà reçu deux doses de vaccin RRO	Non	1 dose ou 2 doses Selon les vaccins déjà administrés et intervalles appropriés entre doses : RRO et anti-varicelle : 4 semaines d'intervalle Deux doses anti-varicelle : 3 mois d'intervalle	Non

Le tableau 3 contient des détails sur la méthode et le calendrier d'administration des vaccins RRO, anti-varicelle et RROV. Le nombre de visites se rapporte aux visites requises pour la série complète de vaccins selon divers scénarios et ne concerne pas le nombre de visites incluses dans les premières séries de vaccins administrés pendant l'enfance.

Tableau 3 : VACCINS RECOMMANDÉS et doses requises pour la série complète de vaccins antirougeoleux, antiourlien, antirubéoleux et anti-varicelle

Âge de l'enfant	Doses administrées		Vaccins recommandés et doses requises pour le programme de vaccination antirougeoleux, antiourlien, antirubéoleux et anti-varicelle (voir ci-dessous pour les intervalles minimums requis entre doses)
	RRO	Var	
12 mois	0 dose	0 dose	<i>Première visite</i> : RRO <i>Deuxième visite</i> : Anti-varicelle à 15 mois <i>Troisième visite</i> : RROV à 4-6 ans
13 - 47 mois	0 dose	0 dose	<i>Si l'enfant est âgé de ≤ 14 mois</i> <i>Première visite</i> : RRO <i>Deuxième visite</i> : Anti-varicelle <i>Troisième visite</i> : RROV à 4-6 ans <i>Si l'enfant est âgé de ≥ 15 mois</i> <i>Première visite</i> : RRO et Anti-varicelle <i>Deuxième visite</i> : RROV à 4-6 ans
	0 dose	1 dose	<i>Première visite</i> : RRO <i>Deuxième visite</i> : RROV à 4-6 ans
	1 dose	0 dose	<i>Première visite</i> : Anti-varicelle <i>Deuxième visite</i> : RROV à 4-6 ans
	1 dose	1 dose	<i>Première visite</i> : RROV à 4-6 ans
	2 doses	0 dose	<i>Si l'enfant est âgé de ≥ 14 mois</i> <i>Première visite</i> : Anti-varicelle <i>Deuxième visite</i> : Anti-varicelle
	2 doses	1 dose	<i>Si l'enfant est âgé de ≥ 14 mois</i> <i>Première visite</i> : Anti-varicelle
4 - 11 ans	0 dose	0 dose	<i>Première visite</i> : RROV <i>Deuxième visite</i> : RROV
	0 dose	1 dose	<i>Première visite</i> : RROV <i>Deuxième visite</i> : RRO
	1 dose	0 dose	<i>Première visite</i> : RROV <i>Deuxième visite</i> : Anti-varicelle
	1 dose	1 dose	<i>Première visite</i> : RROV
	2 doses	0 dose	<i>Première visite</i> : Anti-varicelle <i>Deuxième visite</i> : Anti-varicelle
	2 doses	1 dose	<i>Première visite</i> : Anti-varicelle

Vaccins	Intervalle minimum recommandé entre doses
RRO et RRO / RRO et anti-varicelle	4 semaines
RRO et RROV / RROV et RROV	6 semaines
Deux doses anti-varicelle / Anti-varicelle et RROV	3 mois