

Rotarix™ – Admissibilité et calendriers

Le tableau suivant a été établi à titre d'information uniquement afin de faciliter la tâche des professionnels de la santé au chapitre des critères d'admissibilité et du calendrier de vaccination systématique et de rechange au vaccin Rotarix™. Consultez les *calendriers de vaccination financée par le secteur public* pour plus de détails sur l'âge d'administration pendant l'enfance.

Tableau 1 : VACCINATION SYSTÉMATIQUE – Vaccin antirotavirus (Rotarix™)

Calendrier recommandé pour la vaccination systématique antirotavirus par voie orale	
Âge de vaccination	Nombre de doses recommandé
2 mois	Dose 1
4 mois	Dose 2

Tableau 2 : Vaccins RECOMMANDÉS et doses requises pour la série complète de vaccination au vaccin antirotavirus (Rotarix™)

Autre calendrier recommandé pour la vaccination antirotavirus par voie orale à l'âge de 6 à 24 semaines	
Vaccin et nombre de doses	Calendrier
Vaccin antirotavirus – 1 ^{re} dose	Première visite*
Vaccin antirotavirus – 2 ^e dose	Deuxième visite : 4 semaines après la première visite et à l'âge de ≤24 semaines**

* Bien que le fabricant du vaccin ait indiqué que la première dose de vaccin antirotavirus peut être administrée dès l'âge de six semaines et jusqu'à l'âge de 20 semaines, le CCNI recommande que cette première dose soit donnée entre l'âge de six semaines et celui de 15 semaines, car on ne sait pas dans quelle mesure il est sûr de l'administrer aux nourrissons plus âgés.

Tableau 3 : Vaccins RECOMMANDÉS et âges et intervalles minimums pour l'administration par voie orale du vaccin antirotavirus (Rotarix™)

Âges et intervalles recommandés et minimums pour la vaccination antirotavirus par voie orale				
Vaccin et nombre de doses	Âge recommandé pour cette dose	Âge minimum pour cette dose	Intervalle recommandé entre doses	Intervalle minimum entre doses
Vaccin antirotavirus – 1 ^{re} dose	2 mois	6 semaines	2 mois	4 semaines
Vaccin antirotavirus – 2 ^e dose	4 mois	10 semaines	—	—

COMMENTAIRE : Selon la monographie du vaccin Rotarix™, toutes les doses doivent être administrées avant l'âge de 24 semaines.

La monographie du produit est consultable à : http://www.gsk.ca/english/docs-pdf/Rotarix_2011.pdf